

Wann wird gadoliniumhaltiges MR-Kontrastmittel benötigt:

CAVE:

- **Schwere Niereninsuffizienz: Creatinin über 1,8 (oder besser): reduzierte GFR Clearance Grad IV = unter 30 ml/min**

Sollten Sie bei einem Patienten trotzdem eine KM-Untersuchung benötigen, bitten wir Sie um eine „interne Freigabe“ (auch vom prakt. Arzt)

Magnetresonanztomographie mit KM:

Generell bei Tumorverdacht oder bei Angiographien:

MRT des Neurocraniums: mit KM bei Fragestellung Raumforderung

MRT des Neurocraniums und der Hypophyse

MRT des Gesichtsschädels

MRT der Speicheldrüsen

MRT des Halses

MRT der Schilddrüse

MR-Angiographie der Carotiden

MRT der Leber

MRT des Oberbauches

MRT beider Nebennieren

MRT beider Nieren

MRT des Unterbauches

MRT der Prostata / Uterus und der Adnexen

MR- Angiographie der Nierenarterien

MR- Angiographie der Becken-Beinarterien

MRT der HWS, BWS oder LWS: bei Tumorverdacht in der STIR-Sequenz

MRT eines (Röhren-) Knochens bei Tumor/Osteomyelitis