

Wann wird jodhaltiges Röntgenkontrastmittel benötigt:

CAVE:

- **Unbehandelte Schilddrüsenüberfunktion (TSH erniedrigt)**
- **Schilddrüsenkarzinom**
- **Struma Hashimoto**

- **Niereninsuffizienz: Creatinin über 1,4
(oder besser): reduzierte GFR Clearance Grad III = unter 50 ml/min**

Sollten Sie bei einem Patienten trotzdem eine KM-Untersuchung benötigen, bitten wir Sie um eine „interne Freigabe“ (auch vom prakt. Arzt)

Röntgen:

Nierenröntgen / i.v.Pyelographie
Phlebographie der Beinvenen

Computertomographie:

CT des Gehirnschädels mit KM bei Fragestellung Raumforderung
CT des Gesichtsschädels
CT des Halses
CT des Thorax
PE-CT des Thorax
CT des Abdomens
CT des Oberbauches
CT der Leber
CT des Pankreas
CT des Unterbauches
CT der Nieren und ablaufenden Harnwege
CT der Nebennieren

Angio-CT des Gehirnschädels
Angio-CT der Carotiden
Angio-CT der Nierenarterien
Angio-CT der Aorta thoracalis und abdominalis sowie der Beckenarterien